



NUTRICIA - KOMPLEKSOWE PORTFOLIO NA KAŻDY ETAP POSTĘPOWANIA W ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO

PROPONOWANE STOSOWANIE

Bebilon pepti 1 Syneo

Dostępna gramatura: 400 g



Tabela żywienia

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję	Ilość proszku (gram) na 1 porcję	Przybliżona liczba puszek na 30 dni w zależności od liczby posiłków w ciągu doby
0-2 tygodnie	6	90	3	13,8	7
2-4 tygodnie	5-6	120	4	18,4	7-9
4-8 tygodni	5	150	5	23,0	9
8-16 tygodni	4-5	180	6	27,6	9-11
4-6 miesięcy	4	210	7	32,2	10

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu (13,8 g) = 276 kJ (66 kcal). 1 płaska miarka to 4,6 g proszku. **Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.** Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.

Bebilon pepti 2 Syneo

Dostępna gramatura: 400 g



Tabela żywienia

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek dziecka	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję	Ilość proszku (gram) na 1 porcję	Przybliżona liczba puszek na 30 dni w zależności od liczby posiłków w ciągu doby
6-12 miesięcy	2-3	210	7	33,6	6-8
Powyżej 1. r.ż.	2	210	7	33,6	6
Powyżej 2. r.ż.	2	210	7	33,6	6

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu (14,4 g) = 285 kJ (68 kcal). 1 płaska miarka to 4,8 g proszku. **Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.** Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.

Bebilon pepti MCT

Dostępna gramatura: 450 g



Tabela żywienia

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję	Ilość proszku (gram) na 1 porcję	Przybliżona liczba puszek na 30 dni w zależności od liczby posiłków w ciągu doby
1. miesiąc	7-6	60-90	2-3	9-13,5	4-7
2. miesiąc	6	120	4	18,0	8
3. miesiąc	5	150	5	22,5	8
4. miesiąc	5	180	6	27,0	9
5. miesiąc	5	210	7	31,5	11
6. miesiąc i powyżej	4	210	7	31,5	9

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu (13,5 g) = 276 kJ (66 kcal). 1 płaska miarka to 4,5 g proszku. **Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie.** Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.

Bebilon pepti 1 Syneo, Bebilon pepti 2 Syneo do postępowania dietetycznego w przypadku alergii na białka mleka krowiego. **Bebilon pepti MCT** do postępowania dietetycznego w przypadku alergii na białka mleka krowiego i/lub zaburzeń trawienia i wchłaniania.

Neocate Syneo do postępowania dietetycznego u niemowląt i dzieci w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Neocate LCP do postępowania dietetycznego u niemowląt w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna.

Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Neocate Junior o smaku neutralnym, do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Wyżej wymienione produkty należą do kategorii żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.

Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Nutricia Polska Sp z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa



postać CIEŻKA
= MIESZANKA
AMINOKWASOWA

NUTRICIA - KOMPLEKSOWE PORTFOLIO NA KAŻDY ETAP POSTĘPOWANIA W ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO

PROPONOWANE STOSOWANIE

Neocate Syneo

(dla niemowląt od urodzenia i dzieci)

Dostępna gramatura: 400 g



Tabela żywienia

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia/ dziecka	Przybliżona masa ciała (kg)	Ilość posiłków w ciągu doby	Objętość przegotowanej, ostudzonej wody (ml)	Ilość płaskich miarek proszku Neocate Syneo	Ilość proszku (gram) na 1 porcję	Przybliżona liczba puszek na 30 dni w zależności od liczby posiłków w ciągu doby
Po urodzeniu	3,5	6-7	90	3	14,4	7-8
2 tygodnie	4	6	120	4	19,2	9
2 miesiące	5,5	5-6	150	5	24,0	9-11
3 miesiące	6	5	180	6	28,8	11
5 miesięcy	7,5	4-5	210	7	33,6	11-13
7 miesięcy	8,5	4	210	7	33,6	11
10 miesięcy	9	4	240	8	38,4	12
11-12 miesięcy	9,5	3-4	240	8	38,4	9-12
>12 miesięcy	≥10	2-3	240	8	38,4	6-9

1 płaska miarka to 4,8 g proszku. Zalecane stężenie posiłku (14,4% w/v) uzyskuje się dodając jedną płaską miarkę proszku do 30 ml wody. Osmolalność takiego roztworu (tj. 14,4 g proszku w 100 ml roztworu) wynosi 360 mOsmol/kg H₂O. Niemowle/dziecko może wymagać większych lub mniejszych ilości produktu niż podane w tabeli. Jeśli do diety niemowlęcia jest wprowadzane inne pożywienie, to powinno się to odbywać wyłącznie pod nadzorem lekarza i ilość podawanego produktu może wymagać odpowiedniego zmniejszenia.

Neocate LCP

(dla niemowląt od urodzenia do ukończenia 1. roku życia)

Dostępna gramatura: 400 g



Tabela żywienia

O ile lekarz nie zaleci inaczej

Wiek niemowlęcia	Przybliżona masa ciała (kg)	Ilość posiłków w ciągu doby	Objętość przegotowanej, ostudzonej wody (ml)	Ilość płaskich miarek proszku Neocate LCP	Ilość proszku (gram) na 1 porcję	Przybliżona liczba puszek na 30 dni w zależności od liczby posiłków w ciągu doby
po urodzeniu	3,5	6-7	90	3	13,5	7-8
2 tygodnie	4	6	120	4	18,0	9
2 miesiące	5,5	5-6	150	5	22,5	9-11
3 miesiące	6	5	180	6	27,0	11
5 miesięcy	7,5	4-5	210	7	31,5	10-12
7 miesięcy	8,5	4	210	7	31,5	10
10 miesięcy	9	4	240	8	36,0	11

1 płaska miarka to 4,5 g proszku. Zalecane stężenie posiłku (13,5% w/v) uzyskuje się dodając jedną płaską miarkę proszku do 30 ml wody. Osmolalność takiego roztworu (tj. 13,5 g proszku w 100 ml roztworu) wynosi 340 mOsmol/kg H₂O. Informacje podane w tabeli są jedynie wskazówką. Niemowle może wymagać większych lub mniejszych ilości produktu niż podane w tabeli. Jeśli do diety niemowlęcia jest wprowadzane inne pożywienie, to powinno się to odbywać wyłącznie pod nadzorem lekarza i ilość podawanego produktu może wymagać odpowiedniego zmniejszenia.

Neocate Junior o smaku neutralnym

(dla dzieci powyżej 1. roku życia)

Dostępna gramatura: 400 g



Tabela żywienia

Proponowane stosowanie: ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie muszą być określone wyłącznie przez lekarza i zależą od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta.

Ilość płaskich miarek proszku Neocate Junior	Woda (ml)	Objętość całkowita w przybliżeniu (ml)
1 (7,3 g)	30	35
3 (21,9 g)	90	105
10 (73 g)	300	350

Zalecane stężenie 21,1% w/v (1 kcal/ml) uzyskuje się dodając 1 płaską miarkę proszku na każde 30 ml wody. 1 płaska miarka to 7,3 g proszku.