



SILNE DZIAŁANIE W ALERGII

**ZAGADNIENIA REFUNDACYJNE
ORAZ DAWKOWANIE MIESZANEK**

Bebilon pepti Syneo, Bebilon pepti MCT oraz Neocate

WSKAZANIA REFUNDACYJNE¹:

zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergii pokarmowe, biegunki przewlekłe.



dla niemowląt od urodzenia

dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, dzieci i dorosłych

Kategoria odpłatności:

30%



DO CZASOWEGO STOSOWANIA

dla niemowląt od urodzenia

Kody ICD-10

w alergii na białka mleka krowiego

ALERGIA POKARMOWA Z DOMINACJĄ OBJAWÓW SKÓRNYCH

- L27.2** Zapalenie skóry wywołane spożytą żywnością
- L50.0** Pokrzywka alergiczna
- L20.8** Inne atopowe zapalenia skóry
- L20.9** Atopowe zapalenie skóry nieokreślone
- L23.6** Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane kontaktem pokarmu ze skórą
- L25.4** Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt skóry z żywnością

ALERGIA POKARMOWA Z DOMINACJĄ OBJAWÓW ZE STRONY PRZEWODU POKARMOWEGO

- K52.2** Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego
- K90** Nieprawidłowe wchłanianie jelitowe

ALERGIA POKARMOWA Z DOMINACJĄ OBJAWÓW ZE STRONY UKŁADU ODDECHOWEGO

- J45.0** Dychawica oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn uczuleniowych

OBJAWY INNE, UOGÓLNIONE

- T78.4** Alergia nieokreślona

W dokumentacji medycznej pacjenta muszą się znaleźć kody ICD-10 uzupełnione o część opisową definiującą postać kliniczną alergii.

WSKAZANIA REFUNDACYJNE¹:

postępowanie dietetyczne u niemowląt
w ciężkiej alergii na białka mleka
krowiego oraz złożonej nietolerancji
białek pokarmowych.



refundacja
**do 12. m-ca
życia**

Kategoria
odpłatności:
ryczałt

dla niemowląt
od urodzenia



powyżej 1. roku życia
o smaku neutralnym



powyżej 1. roku życia
o smaku waniliowym



powyżej 1. roku życia
o smaku truskawkowym

Kody ICD-10 w alergii na białka mleka krowiego

K 52.2
K 90.4
T 78.1
T 78.4 Reakcja anafilaktyczna

K 52.2
K 90.4 Objawy nie ustąpiły po zastosowaniu
mieszanki o wysokim stopniu hydrolizy (eHF)

K 52.2
K 90.4 Ciężkie objawy ze strony układu pokarmowego

L 27.2
L 20.8 Ciężka postać AZS

K 52.2
K 90.4
T 78.1
T 78.4
L 27.2 Alergia wielopokarmowa

K 52.2
K 90.4
T 78.1
T 78.4 Zaburzenia wzrastania

K 52.2
K 90.4 Objawy występujące w przypadku karmienia wyłącznie
piersią z zastosowaniem diety eliminacyjnej u matki

**W dokumentacji medycznej pacjenta
muszą się znaleźć kody ICD-10 uzupełnione o część opisową
definiującą postać kliniczną alergii.**

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

PRZYPOMINAMY

Zgodnie z polskim prawem każdy lekarz (oprócz lekarza w trakcie stażu) niezależnie od specjalizacji może²:

- ✓ inicjować wprowadzenie hydrolizatów znacznego stopnia oraz mieszanek aminokwasowych,
- ✓ kontynuować wcześniejsze zalecenia innego lekarza,
- ✓ wystawiać recepty na produkty refundowane.



DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Kluczowe informacje, które powinny znaleźć się w historii choroby pacjenta **przy inicjacji mieszanki Neocate LCP:**

- ✓ pogłębiony wywiad lekarski, ukierunkowany na alergię i występowanie chorób alergicznych w rodzinie,
- ✓ obraz kliniczny pacjenta - badanie fizykalne, opis objawów (m.in. skórne, ze strony przewodu pokarmowego, układu oddechowego),
- ✓ wykluczenie innych niż alergiczne przyczyn stanu chorobowego,
- ✓ rozpoznanie z podaniem kodu ICD-10,
- ✓ zalecenia odnośnie inicjacji mieszanki elementarnej - należy podać dawkowanie, wraz z jednoczesnym skierowaniem do specjalisty celem pogłębionej diagnostyki (tylko jeśli jest to konieczne),
- ✓ informacja o próbie eliminacji i prowokacji.

3 ważne kroki w pracy z produktem refundowanym:

1

W dokumentacji medycznej pacjenta **musi się znaleźć dokładny opis objawów** wraz z ich nasileniem – informacje uzyskane podczas wywiadu lekarskiego, przeprowadzonego w czasie wizyty.

2

Na podstawie powyższych danych – **postawienie rozpoznania według ICD-10** (na podstawie objawów) wraz z częścią opisową **odwołującą się do konkretnego wskazania refundacyjnego.**

3

Preskrypcja produktu refundowanego np. Bebilon pepti 1 Syneo, Neocate LCP **wraz ze skierowaniem do dalszej pogłębionej diagnostyki u lekarza specjalisty**, tylko jeśli jest to uzasadnione.

DAWKOWANIE

Bebilon pepti 1 Syneo

dla niemowląt od urodzenia

Dostępna gramatura: 400 g

Tabela żywienia O ile lekarz nie zaleci inaczej				
Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję	Przybliżona liczba puszek na 30 dni w zależności od liczby posiłków w ciągu doby
0-2 tygodnie	6	90	3	7
2-4 tygodnie	5-6	120	4	7-9
4-8 tygodni	5	150	5	9
8-16 tygodni	4-5	180	6	9-11
4-6 miesięcy	4	210	7	10

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal). 1 płaska miarka to 4,6 g proszku.

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.

Bebilon pepti 2 Syneo

dla niemowląt powyżej

6. m-ca życia, dzieci i dorosłych

Dostępna gramatura: 400 g

Tabela żywienia O ile lekarz nie zaleci inaczej				
Wiek dziecka	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję	Przybliżona liczba puszek na 30 dni w zależności od liczby posiłków w ciągu doby
6-12 miesięcy	2-3	210	7	6-8
Powyżej 1. r.ż.	2	210	7	6
Powyżej 2. r.ż.	2	210	7	6

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 285 kJ (68 kcal). 1 płaska miarka to 4,8 g proszku.

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.

Bebilon pepti MCT

dla niemowląt od urodzenia

Dostępna gramatura: 450 g

Tabela żywienia O ile lekarz nie zaleci inaczej				
Wiek niemowlęcia	Liczba porcji na dobę	Woda (ml) na 1 porcję	Liczba płaskich miarek na 1 porcję	Przybliżona liczba puszek na 30 dni w zależności od liczby posiłków w ciągu doby
1. miesiąc	7-6	60-90	2-3	4-7
2. miesiąc	6	120	4	8
3. miesiąc	5	150	5	8
4. miesiąc	5	180	6	9
5. miesiąc	5	210	7	11
6. miesiąc i powyżej	4	210	7	9

Standardowy roztwór: 100 ml gotowego do spożycia produktu = 90 ml wody + 3 płaskie miarki produktu = 276 kJ (66 kcal). 1 płaska miarka to 4,5 g proszku.

Wartości podane w tabeli należy traktować orientacyjnie. Wielkość i liczbę posiłków dostosuj do potrzeb dziecka.



DAWKOWANIE

Neocate LCP

dla niemowląt od urodzenia
do ukończenia 1. roku życia

Dostępna gramatura: 400 g

Tabela żywienia

Wiek niemowlęcia	Przybliżona masa ciała (kg)	Ilość płaskich miarek proszku Neocate LCP	Objętość przegotowanej, ostudzonej wody (ml)	Ilość posiłków w ciągu doby	Przybliżona liczba puszek na 30 dni w zależności od liczby posiłków w ciągu doby
Noworodek	3,5	3	90	6-7	7-8
2 tygodnie	4	4	120	6	9
2 miesiące	5,5	5	150	5-6	9-11
3 miesiące	6	6	180	5	11
5 miesięcy	7,5	7	210	4-5	10-12
7 miesięcy	8,5	7	210	4	10
10 miesięcy	9	8	240	4	11

1 płaska miarka to 4,5 g proszku. Zalecane stężenie posiłku (13,5% w/v) uzyskuje się dodając jedną płaską miarkę proszku do 30 ml wody.

Informacje podane w tabeli są jedynie wskazówką. Niemowlę może wymagać większych lub mniejszych ilości produktu niż podane w tabeli. Jeśli do diety niemowlęcia jest wprowadzane inne pożywienie, to powinno się to odbywać wyłącznie pod nadzorem lekarza i ilość podawanego produktu może wymagać odpowiedniego zmniejszenia.



Neocate Junior o smaku neutralnym, waniliowym i truskawkowym dla dzieci powyżej 1. roku życia

Dostępna gramatura: 400 g

Tabela żywienia

Proponowane dawkowanie: Ilość produktu do spożycia i rozcieńczenie muszą być określone wyłącznie przez lekarza i zależą od wieku, masy ciała oraz stanu klinicznego pacjenta.

Ilość miarek	Woda (ml)	Objętość całkowita w przybliżeniu (ml)
1 (7,3 g)	30	35
3 (21,9 g)	90	105
10 (73 g)	300	350

Zalecane stężenie 21,1% w/v (1 kcal/ml) uzyskuje się dodając 1 płaską miarkę proszku na każde 30 ml wody. 1 płaska miarka = 7,3 g proszku.

Neocate Junior występuje w trzech smakach: neutralnym, waniliowym i truskawkowym



SILNE DZIAŁANIE W ALERGII



WSZECHESTRONNE WSPARCIE DLA TWOICH PACJENTÓW Z ALERGIĄ NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO I ICH RODZIN

- na **każdym etapie** postępowania dietetycznego w przypadku **alergii na białka mleka krowiego**
- w **objawach ze strony różnych układów i o różnym nasileniu**¹⁻⁴
- skuteczność **potwierdzona w badaniach klinicznych**¹⁻⁴

Referencje: 1. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2021 r. 2. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentyisty z dnia 5 grudnia 1996 r. z późn. zmianami, Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152 oraz ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr 126 poz. 1381). Źródłem kodów jest baza Pharmindex.

1. Van der Aa LB, et al., ClinExp Allergy, 40(5):795-804,2010. 2. Van der Aa LB, et al., Allergy, 66(2): 170-177, 2011. 3. De Boissieu D. et al., TheJournal of Pediatrics, 131(5): 744-747, 1997. 4. Vanderhoof J.A. et al., TheJournal of Pediatrics, 131(5): 741-744, 1997.

Bepilon pepti 1 Syneo, Bepilon pepti 2 Syneo – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w przypadku alergii pokarmowej na białka mleka krowiego, do stosowania pod nadzorem lekarza. **Neocate pepti MCT** – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego w przypadku alergii na białka mleka krowiego i/lub zaburzeń trawienia i wchłaniania, do stosowania pod nadzorem lekarza. Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym sposobem żywienia niemowlęcia.

Neocate LCP – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u niemowląt w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią. **Neocate Junior** o smaku neutralnym, waniliowym i truskawkowym – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna, do stosowania pod nadzorem lekarza.

Nutricia Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Więcej informacji dla lekarzy: www.akademiabepilon.pl; portal dla rodziców: www.alergianamlekokrowie.pl

Materiał przeznaczony dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za opiekę nad matkami i dziećmi.