

Według **ESPGHAN**¹ i **WAO**² w przypadku ABMK i braku enteropatii,
hydrolizat z laktozą jest preferowany.



Hydrolizaty znacznego stopnia są pierwszym wyborem
w większości przypadków **ABMK** polecanym przez:

WAO
2024³

ESPGHAN
2024¹

EAACI
2024⁴

GALEN
2022⁵

PTGHIŻD
2021⁶

BEBILON PEPTI SYNEO
JEDYNY HYDROLIZAT ZNACZNEGO
STOPNIA Z LAKTOZĄ

ABMK – alergia na białka mleka krowiego

1. Vandenplas Y, Koletzko S, Fleischer DM, et al. An ESPGHAN Position Paper on the Diagnosis, Management, and Prevention of Cow's Milk Allergy. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024 Feb;78(2):386-413. 2. Heine RG, Al Refaie F, Bachina P, i wsp.: Lactose intolerance and gastrointestinal cow's milk allergy in infants and children – common misconceptions revisited. World Allergy Organ J 2017; 10: 41. 3. Fiocchi A, Dahdah L, Al-Hammadi S, et al. World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy (DRACMA) Guidelines Update. World Allergy Organ J. 2024;17(1):100853. 4. Dupont C, Eigenmann P, Fiocchi A, et al. EAACI Guidelines for the Management of Food Allergy and Anaphylaxis in Infants and Children. Allergy. 2024;79(4):1012-1043. 5. Muraro A, et al; GA2LEN Food Allergy Guideline Group; GALEN Food Allergy Guideline Group. Managing food allergy: GA2LEN guideline 2022. World Allergy Organ J. 2022 Sep 7;15(9):100687. 6. Horvath A, i wsp., STANDARDY MEDYCZNE/ PEDIATRIA, 2021, T. 18, 342-326.