

PRÓBA PROWOKACJI W CELU SPRAWDZENIA NABYCIA TOLERANCJI NA BMK

Pierwszą próbę prowokacji (wykazującą ewentualne nabycie tolerancji na białka mleka krowiego) można **przeprowadzić po 6-9 mies. od wprowadzenia eliminacji lub po ukończeniu przez dziecko 1. roku życia**¹. Czas pomiędzy kolejnymi prowokacjami uzależniony jest przede wszystkim od ciężkości przebiegu reakcji niepożądanych w przeszłości. Zwykle **sugerowany przez ekspertów okres to 6-12 miesięcy u dzieci < 5. r.ż.**²

W przypadku bardzo ciężkich układowych reakcji oraz utrzymywania się wysokich stężeń sIgE, czas ten można wydłużyć nawet do 2-3 lat². Każdorazowe odstępianie od próby prowokacji z powodów medycznych – musi być uzasadnione w dokumentacji medycznej.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRÓBY PROWOKACJI UPEWNIJ SIĘ, CZY:

- ✔ uzyskana została zgoda od opiekuna pacjenta,
- ✔ pacjent na pewno nie spożywa białek mleka krowiego,
- ✔ występuje niskie ryzyko pojawienia się działań niepożądanych,
- ✔ dziecko jest zdrowe bez cech infekcji, poza okresem ząbkowania czy szczepienia,
- ✔ choroby przewlekłe (w tym astma czy atopowe zapalenie skóry) są dobrze kontrolowane,
- ✔ rodzice odstawili leki, które mogą wpływać na wynik i interpretację DPP,
- ✔ dziecko jest na czczo min. 2-4 godz. przed DPP.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA POWINNA ZAWIERAĆ PONIŻSZE INFORMACJE:

- ✔ Data próby
- ✔ Miejsce próby
- ✔ Wybrany produkt do DPP i jego ilość
- ✔ Wynik DPP
- ✔ Opis ew. reakcji niepożądanych
- ✔ Powód ewentualnego odstępiania od próby prowokacji

BMK – białka mleka krowiego.

1. Horvath A. i wsp. Diagnostyka i leczenie alergii na białka mleka krowiego. Stanowisko Sekcji Alergii na Pokarmy Polskiego PTGHiZD, STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA, 2021, T. 18, 342-362. 2. Jarocka-Cyrta E. i wsp. Doustne próby prowokacji w diagnostyce alergii na białka mleka krowiego. Stanowisko Grupy Roboczej Sekcji Alergii Pokarmowej PTGHiZD, STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA, 2015, T. 12, 501-516.