

Nutridrink Protein dla pacjentów przed, w trakcie i po hospitalizacji



- ✓ Wysokobiałkowy i wysokoenergetyczny
- ✓ Niezbędne składniki odżywcze skoncentrowane w małej objętości 125 ml
- ✓ Bezglutenowy
- ✓ Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych

Dostępny w 7 smakach



Proponowane stosowanie
2x
dziennie przez
MINIMUM 14 dni*
najlepiej przez cały
okres leczenia
i rekonwalescencji

Nutridrink Skin Repair dla pacjentów z trudno gojącymi ranami, np. po zabiegach operacyjnych albo z odleżynami



- ✓ Wysokobiałkowy i wysokoenergetyczny
- ✓ Zawiera argininę, cynk i antyoksydanty
- ✓ Niski indeks glikemiczny
- ✓ Bezglutenowy
- ✓ Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych

Dostępny w 3 smakach

Proponowane stosowanie
2-3x
dziennie przez
MINIMUM 21 dni**
aż do całkowitego
wygojenia rany

Diasip dla pacjentów z cukrzycą i hiperглиkemią przed, w trakcie i po hospitalizacji



- ✓ Opracowany z myślą o pacjentach z cukrzycą
- ✓ Zawiera rozpuszczalne i nierozpuszczalne frakcje błonnika
- ✓ Niski indeks glikemiczny - głównym źródłem węglowodanów jest izomaltuloza
- ✓ Kompletny pod względem odżywczym, bezglutenowy
- ✓ Skuteczność potwierdzona w badaniach klinicznych

Dostępny w 2 smakach

Proponowane stosowanie
2x
dziennie przez
MINIMUM 14 dni***
najlepiej przez cały
okres leczenia
i rekonwalescencji

Wejdź na www.akademianutricia.pl i korzystaj z materiałów edukacyjnych oraz zamawiaj materiały dla swoich pacjentów!




Uniknij u swoich pacjentów konsekwencji związanych z SYNDROMEM POSZPITALNYM



Pacjenci poddani rozległej operacji mogą **tracić nawet 1 kg masy mięśniowej dziennie**.¹



Odbudowa 1,5 kg tkanki mięśniowej trwa średnio **aż 6 miesięcy**.²



POBIERZ GOTOWĄ FORMATKĘ na wypis uwzględniającą żywienie opracowaną przez POLSPEN



*Zalecane stosowanie 1-3 butelki dziennie przez minimum 14 dni. **Zalecane stosowanie 1-3 butelki dziennie przez minimum 21 dni. ***Zalecane stosowanie 1-3 butelki na dobę jako uzupełnienie diety, 7-10 butelek na dobę jako jedyne źródło pożywienia.

Wsparcie żywieniowe powinno być zalecone przez lekarza w takiej ilości i na tak długo jak pacjent tego potrzebuje.

1. Wischmeyer P., Are we creating survivors... or victims in critical care? Delivering targeted nutrition to improve outcomes. Current opinion in critical care, 2016, 22.4: 279-284
2. Verdjik, J. Gerontol. A Biol. Sci. Med. Sci., 2009, 64.3: 332-339.

Nutridrink Protein, Nutridrink Skin Repair, Diasip, PreOp to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Nutridrink Protein do postępowania dietetycznego w niedożywieniu i ryzyku niedożywienia związanym z chorobą, szczególnie u pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem białkowym. Nutridrink Skin Repair do postępowania dietetycznego w przypadku odleżyn i innych trudno gojących ran. Diasip do postępowania dietetycznego w niedożywieniu związanym z chorobą u pacjentów z cukrzycą i pacjentów z hiperglykemią. PreOp do przedoperacyjnego postępowania dietetycznego u pacjentów poddawanych planowanemu zabiegom chirurgicznym.

Do stosowania pod nadzorem lekarza.

Materiał przeznaczony dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.

Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

HOSP/CHIR/1/10/2025

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION



BEZ ŻYWIENIA NIE MA LECZENIA

Bez żywienia nie ma ERAS:
od prehabilitacji po wypis.^{1,2}



1. Weimann, Clin Nutr, 2025. 2. Gustafsson, Surgery, 2025.

22% etapów ERAS dotyczy żywienia¹

– to klucz do skutecznej rekonwalescencji².



PREHABILITACJA

KORZYŚCI KLINICZNE^{3,4}:



redukcja powikłań
infekcyjnych



mniejsze ryzyko
nieszczelności
zespoleń



poprawa ogólnej
kondycji pacjenta
przed zabiegiem

PRZEDOPERACYJNA PODAŻ NAPOJU WĘGLOWODANOWEGO

KORZYŚCI KLINICZNE²:



zmniejsza
pooperacyjną
insulinooporność



poprawia
samopoczucie
pacjenta



skraca czas
pobytu
w szpitalu



Rozpocznij
żywienie w ciągu
kilku godzin po
operacji - do 24h¹²

ZABIEG

POOPERACYJNA OPIEKA ŻYWIENIOWA

KORZYŚCI KLINICZNE¹:



zmniejsza
ryzyko powikłań



chroni przed utratą
tkanki mięśniowej



wspiera gojenie
i regenerację
po zabiegu

PROPONOWANE STOSOWANIE⁴:

2x ONS dziennie
min. 7-14 dni



PROPONOWANE STOSOWANIE²:

✓ **800 ml**
wieczorem przed zabiegiem
✓ **400 ml**
2 godziny przed znieczuleniem



PROPONOWANE STOSOWANIE^{5,6}:

2x ONS dziennie
min. 4-6 tygodni



PORADNIK o prehabilitacji
„Czwórka dla zdrowia. Podaj dalej...”



PORADNIK
„Wychodzę ze szpitala i... co dalej?”



PORADNIK o gojeniu ran
„O RANY”