



Schemat postępowania w przypadku podejrzenia alergii na białka mleka krowiego (ABMK) u niemowląt i dzieci wg ESPGHAN¹.



Schemat jest odwzorowaniem schematu zawartego w stanowisku Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN)¹.

PRZYKŁADOWE
OBJAWY ABMK
- POSTAĆ ŁAGODNA
I UMIARKOWANA²

- OBJAWY Z PRZEWODU POKARMOWEGO**
- Częste regurgitacje, wymioty
 - Biegunka, zaparcia (obecność lub brak zmian skórnych wokół odbytu)
 - Krew w stolcu
 - Niedokrwistość z niedoboru żelaza
- OBJAWY SKÓRNE**
- AZS
 - Obrzęki warg lub powiek
 - Pokrzywka niezwiązana z infekcją, lekami itp.
- OBJAWY Z UKŁADU ODDECHOWEGO (NIEZWIĄZANE Z INFЕКCJĄ)**
- Katar, kaszel
- OGÓLNE**
- Długotrwały niepokój lub kolka brzuszna

WSKAZANIA
DO ZASTOSOWANIA
MIESZANKI AAF³

8 czerwonych flag

- Objawy alergii, które nie ustąpiły w pełni po zastosowaniu hydrolizatów białka o znacznym stopniu hydrolizy
- Ciężkie złożone reakcje z przewodu pokarmowego na alergen pokarmowy
- Alergia złożona wielopokarmowa
- Ciężkie AZS
- Anafilaksja
- Zaburzenia procesów wzrastania
- Zespół zapalenia jelit wywołany białkami pokarmowymi (FPIES)*
- Eozynowe zapalenie przełyku (EoE)

JEDYNE PORTFOLIO,
umożliwiające prowadzenie pacjenta
przez cały algorytm ESPGHAN¹
w postępowaniu w ABMK

ALERGIA NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO

ŁAGODNA I UMIARKOWANA POSTAĆ ABMK

- eHF**
- Bebilon pepti 1 i 2 SYNEO**
- Hydrolizat białek mleka o znacznym stopniu hydrolizy (eHF)
 - Pierwszy wybór dla niemowląt i dzieci z ABMK
 - Z synbiotykiem (scFOS/lcFOS oraz *B. breve*)
 - Z laktozą



CIEŻKA POSTAĆ ABMK

- HRF**
- Bebilon pepti RICE PRO**
- Hydrolizat białka ryżu (HRF)
 - Roślinna alternatywa dla niemowląt i małych dzieci z ABMK już od pierwszych objawów
 - Z prebiotykiem roślinnym (scFOS/lcFOS)
 - Bez laktozy
- AAF**
- Neocate SYNEO**
- Mieszanka elementarna (AAF) 100% wolnych aminokwasów
 - Dla niemowląt i dzieci z ciężką postacią ABMK
 - Z synbiotykiem (scFOS/lcFOS oraz *B. breve*)
 - Bez laktozy



¹Część ekspertów dopuszcza przy dobrej tolerancji stosowanie hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy białka. 1. Algorytm znajdujący się w publikacji: Vandenplas Y, et al.; An ESPGHAN Position Paper on the Diagnosis, Management, and Prevention of Cow's Milk Allergy. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024 Feb;78(2):386-413. 2. Krogulska A i wsp., Terapia, Nr 3 (398), 2021. 3. Horvath A. i wsp., STANDARDY MEDYCZNE/PEDIATRIA, 2021, T. 18, 342-326.

Bebilon pepti 1 Syneo, Bebilon pepti RICE PRO to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego do postępowania dietetycznego w przypadku alergii pokarmowej na białka mleka krowiego. **Neocate Syneo** to żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego u niemowląt i dzieci w alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna. Do stosowania pod nadzorem lekarza, po rozważeniu wszystkich możliwych sposobów żywienia, w tym karmienia piersią.

Nutricia Polska Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa

Materiał przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia lub farmacji.